

HMG-CoA還元酵素阻害剤(スタチン)のフロー図

スタチン (発売順・薬価2022.11)

プラバスタチン

先発品 (37.0円10mg/日)
後発品 (10.1-19.3円10mg/日)

シンバスタチン

先発品 (43.0円5mg/日)
後発品 (14.6-22.6円5mg/日)

フルバスタチン

先発品 (44.7円20mg/日)
後発品 (22.1円20mg/日)

アトルバスタチン

先発品 (49.2円10mg/日)
後発品 (14.8-28.5円10mg/日)

ピタバスタチン

先発品 (70.3円2mg/日)
後発品 (17.4-22.6円2mg/日)

ロスバスタチン

先発品 (57.7円5mg/日)
後発品 (13.0-26.4円5mg/日)

早期から最大量の
ストロングスタチンが推奨

アトルバスタチン
ピタバスタチン
ロスバスタチン

承認用量の幅が広く
用量調整がしやすい

ロスバスタチン

2.5mg~20mg/日

CYP3A4の寄与率が低い
薬物相互作用が少ない

プラバスタチン
ピタバスタチン
ロスバスタチン

口腔内崩壊錠あり

アトルバスタチン
ピタバスタチン
ロスバスタチン

禁忌に重篤な肝機能障害
の記載なし

プラバスタチン

日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版」など国内のガイドラインにおいて、特定のスタチンは推奨されていない

・日常診療に活かす診療ガイドライン UP-TO-DATE2020→2021
・動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版
・動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症診療ガイドライン2018年版

効能・効果	第一推奨薬	第二推奨薬
高コレステロール血症 家族性 高コレステロール血症	<div data-bbox="563 225 1217 308" style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px;"> ロスバスタチン(クレストール®) </div> <ul style="list-style-type: none"> * 水溶性ストロングスタチン * CYP3A4の寄与率が低い * 承認用量の幅が広く用量調整しやすい * 口腔内崩壊錠あり * 最も安価 * シクロスポリンと併用禁忌 * 酸化マグネシウム併用で血中濃度低下 (同時服用で血中濃度50%低下) 	<div data-bbox="1498 225 2025 308" style="border: 1px solid black; background-color: #d9ead3; padding: 5px;"> ピタバスタチン(リバロ®) </div> <ul style="list-style-type: none"> * 脂溶性ストロングスタチン * CYP3A4の寄与率が低い * 「10歳以上の小児における家族性高コレステロール血症」の 適応あり * 口腔内崩壊錠あり * シクロスポリンと併用禁忌 <div data-bbox="1498 608 2153 691" style="border: 1px solid black; background-color: #d9ead3; padding: 5px;"> アトルバスタチン(リピトール®) </div> <ul style="list-style-type: none"> * 脂溶性ストロングスタチン * CYP3A4の寄与率が高い * 糸球体濾過量保持作用が示唆される * 口腔内崩壊錠あり <div data-bbox="1498 879 2127 962" style="border: 1px solid black; background-color: #d9ead3; padding: 5px;"> プラバスタチン(メバロチン®) </div> <ul style="list-style-type: none"> * 水溶性スタンダードスタチン * CYP3A4の寄与率が低い * 肝機能障害を受けにくい * 半減期が短いため1日2回投与可能 * 細粒あり


日本では2021年4月時点で、ストロングスタチン(アトルバスタチン、ピタバスタチン、ロスバスタチン)、スタンダードスタチン(シンバスタチン、プラバスタチン、フルバスタチン)が発売されている。日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版」など国内のガイドラインにおいて、特定のスタチンは推奨されていない。日本循環器学会「急性冠症候群ガイドライン2018年改訂版」においては、日本のACS患者においては、早期から最大量のストロングスタチンが推奨されている。各適応症ごとに用法用量が異なるのでご注意ください。

【参考】
脂質異常症診療ガイドライン2018


HMG-CoA還元酵素阻害剤（スタチン） 薬価比較グラフ

同一成分でも薬価に差があり、棒グラフとして表した。

円 HMG-CoA還元酵素阻害剤（スタチン）維持用量の1日薬価の比較（2023年1月現在）



円 HMG-CoA還元酵素阻害剤（スタチン）維持用量の30日分での薬価比較（2023年1月現在）



HMG-CoA還元酵素阻害剤(スタチン) 推奨後発品

ロスバスタチン:

「サワイ」「ニプロ」「トーワ」

ピタバスタチン:

「トーワ」「KOG(テイカ製薬)」「NP(ニプロ)」「サワイ」

アトルバスタチン:

「トーワ」「NP(ニプロ)」「サワイ」

プラバスタチン:

「サワイ」「トーワ」「テバ」