

ヘルペス治療薬フロー図

2025年8月 初版

ヘルペス治療薬

(薬価2025.4月)

アシクロビル

先発313.0円4,000mg/日

後発335.0円4,000mg/日

バラシクロビル

先発872.4円3,000mg/日

後発405.0-706.8円3,000mg/日

ファムシクロビル

先発1326.6円1,500mg/日

後発413.4-496.8円1,500mg/日

アメナメビル

先発2297.4円400mg/日

適応の幅が広い

単純疱疹 帯状疱疹 性器ヘルペスの再発抑制
造血幹細胞移植における単純疱疹の発生抑制
成人の水痘に対しては唯一使用可能な薬剤

バラシクロビル

1日1回投与

アメナメビル

クレアチンクリアランスに基づく用量調整は不要

アメナメビル

クレアチンクリアランスに基づく用量調整が必要

アシクロビル、
バラシクロビル、
ファムシクロビル

再発性の単純疱疹に適応あり、
次回再発分を処方可

ファムシクロビル、
アメナメビル

帯状疱疹治療における4剤の
有効性に大きな差はないもの
と考えられる

ヘルペス治療薬


		アシクロビル		バラシクロビル	ファムシクロビル	アメナメビル
先発		ゾビラックス		バルトレックス	ファムビル	アメナリーフ
後発		アシクロビル		バラシクロビル	ファムシクロビル	
規格		200mg	400mg	500mg	250mg	200mg
先発薬価		31.9	54.4	215.5	290.4	1215.3
後発薬価		21.2	36.7	85.2-107.4	91.1	
適応	①単純疱疹	○		○	○	
	②造血幹細胞移植における単純疱疹の発生抑制	○		○		
	③帯状疱疹	○		○	○	○
	④水痘			○		
	⑤性器ヘルペスの再発抑制			○		
	⑥再発性の単純疱疹				○	○
用法・用量		①1回200mgを1日5回 ②1回200mgを1日5回 ③1回800mgを1日5回		①1回500mgを1日2回 ②1回500mgを1日2回 ③1回1000mgを1日3回 ④1回1000mgを1日3回 ⑤1回500mgを1日1回	①1回250mgを1日3回 ③1回500mgを1日3回 ⑥1回1000mgを1日2回	③1回400mgを1日1回 ⑥1回1200mgを1日1回

効能・効果	第一推奨薬	第二推奨薬
ヘルペス治療薬	<p>バラシクロビル(バルトレックス®)</p> <p>適応の幅が最も広い 単純疱疹 帯状疱疹 造血幹細胞移植における単純疱疹の発生抑制 性器ヘルペスの再発抑制 成人の水痘に対しては唯一使用可能な薬剤 腎排泄のため用量調整が必要 再発性の単純疱疹に適応なし</p>	<p>アメナメビル(アメナリーフ®)</p> <p>1日1回投与 腎機能による用量調整は不要 帯状疱疹に適応あり 再発性の単純疱疹に適応あり 次回再発分を処方可</p> <p>ファムシクロビル(ファムビル®)</p> <p>腎排泄のため用量調整が必要 単純疱疹、帯状疱疹に適応あり 再発性の単純疱疹に適応あり 次回再発分を処方可</p>

日本では2025年5月、4種類(アシクロビル製剤、バラシクロビル塩酸塩製剤、ファムシクロビル製剤、アメナメビル製剤)より選択できる。本フォーミュラリは成人のヘルペス治療に用いられる経口剤のフォーミュラリである。

ヘルペス治療薬 薬価比較グラフ(2025.4)

同一成分でも薬価に差があり、棒グラフとして表した



バラシクロビル

クレアチニンクリアランス (mL/min)	単純疱疹 造血幹細胞移植における単 純ヘルペスウイルス感染症 (単純疱疹)の発症抑制	帯状疱疹 水痘	性器ヘルペスの再発抑制
≥ 50	500mgを12時間毎	1000mgを8時間毎	500mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数 100/mm ³ 以上)には、500mgを12時間毎
30～49	500mgを12時間毎	1000mgを12時間毎	500mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数 100/mm ³ 以上)には、500mgを12時間毎
10～29	500mgを24時間毎	1000mgを24時間毎	250mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数 100/mm ³ 以上)には、500mgを24時間毎
< 10	500mgを24時間毎	500mgを24時間毎	250mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数 100/mm ³ 以上)には、500mgを24時間毎
HD(血液透析) PD(腹膜透析)	単純疱疹 1日250mgを週3回HD後	帯状疱疹 体重60Kg以上で非高齢者で は 1回500mgを週3回HD後	

ファムシクロビル

クレアチニンクリアランス(ml/min)	単純疱疹	再発性単純疱疹	帯状疱疹
通常	1回250mg 1日3回	1回1000mg 1日2回	1回500mg 1日3回
≥60	1回250mg 1日3回	1回1000mg 1日2回	1回500mg 1日3回
40-59	1回250mg 1日3回	1回500mg 1日2回	1回500mg 1日2回
20-39	1回250mg 1日2回	500mg 単回	1回500mg 1日1回
<20	1回250mg 1日1回	250mg 単回	1回250mg 1日1回
HD(血液透析)	週3回HD後に250mg		
CAPD(持続携行式腹膜透析)	2日に1回CAPD後250mg		

ヘルペス治療薬推奨後発品

• バラシクロビル：

「SPKK（サンド）」 「トーワ」 「サワイ」

• ファムシクロビル：

「日医工」 「トーワ」 「サワイ」