

ヘルペス治療薬フロー図

2025年8月 初版

ヘルペス治療薬

(薬価2026.4月)

アシクロビル

先発285.0円4,000mg/日

後発326.0円4,000mg/日

バラシクロビル

先発672.6円3,000mg/日

後発386.4～672.6円3,000mg/日

ファムシクロビル

先発1081.2円1,500mg/日

後発396.0～436.2円1,500mg/日

アメナメビル

先発2248.6円400mg/日

適応の幅が広い

単純疱疹 帯状疱疹 性器ヘルペスの再発抑制
造血幹細胞移植における単純疱疹の発生抑制
成人の水痘に対しては唯一使用可能な薬剤

バラシクロビル

1日1回投与

アメナメビル

クレアチンクリアランスに基づく用量調整は不要

アメナメビル

クレアチンクリアランスに基づく用量調整が必要


アシクロビル、
バラシクロビル、
ファムシクロビル

再発性の単純疱疹に適応あり、
次回再発分を処方可

ファムシクロビル、
アメナメビル

帯状疱疹治療における4剤の
有効性に大きな差はないもの
と考えられる

ヘルペス治療薬 薬価比較グラフ(2026.4)



ゾビラックス錠（先発品）の1日薬価は、後発品の全ての銘柄よりも安価である。

バルトレックス錠（先発品）の1日薬価は一部の後発品（「EE」「NIG」「トーワ」「日本臓器」）と同薬価である。

ヘルペス治療薬

		アシクロビル		バラシクロビル	ファムシクロビル	アメナメビル
先発		ゾビラックス		バルトレックス	ファムビル	アメナリーフ
後発		アシクロビル		バラシクロビル	ファムシクロビル	
規格		200mg	400mg	500mg	250mg	200mg
先発薬価		11.8	28.5	112.1	180.2	1124.3
後発薬価		18.3	32.6	64.4～112.1	66.0～72.7	
適応	①単純疱疹	○		○	○	
	②造血幹細胞移植における単純疱疹の発生抑制	○		○		
	③帯状疱疹	○		○	○	○
	④水痘			○		
	⑤性器ヘルペスの再発抑制			○		
	⑥再発性の単純疱疹				○	○
用法・用量		①1回200mgを1日5回 ②1回200mgを1日5回 ③1回800mgを1日5回		①1回500mgを1日2回 ②1回500mgを1日2回 ③1回1000mgを1日3回 ④1回1000mgを1日3回 ⑤1回500mgを1日1回	①1回250mgを1日3回 ③1回500mgを1日3回 ⑥1回1000mgを1日2回	③1回400mgを1日1回 ⑥1回1200mgを1日1回

効能・効果	第一推奨薬	第二推奨薬
ヘルペス治療薬	バラシクロビル(バルトレックス®) 適応の幅が最も広い 単純疱疹 帯状疱疹 造血幹細胞移植における単純疱疹の発生抑制 性器ヘルペスの再発抑制 成人の水痘に対しては唯一使用可能な薬剤 腎排泄のため用量調整が必要 再発性の単純疱疹に適応なし	アメナメビル(アメナリーフ®) 1日1回投与 腎機能による用量調整は不要 帯状疱疹に適応あり 再発性の単純疱疹に適応あり 次回再発分を処方可 ファムシクロビル(ファムビル®) 腎排泄のため用量調整が必要 単純疱疹、帯状疱疹に適応あり 再発性の単純疱疹に適応あり 次回再発分を処方可

日本では2025年5月、4種類(アシクロビル製剤、バラシクロビル塩酸塩製剤、ファムシクロビル製剤、アメナメビル製剤)より選択できる。
本フォーミュラは成人のヘルペス治療に用いられる経口剤のフォーミュラである。

バラシクロビル

クレアチニンクリアランス (mL/min)	単純疱疹 造血幹細胞移植における単 純ヘルペスウイルス感染症 (単純疱疹)の発症抑制	带状疱疹 水痘	性器ヘルペスの再発抑制
≥ 50	500mgを12時間毎	1000mgを8時間毎	500mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数 100/mm ³ 以上)には、500mgを12時間毎
30～49	500mgを12時間毎	1000mgを12時間毎	500mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数 100/mm ³ 以上)には、500mgを12時間毎
10～29	500mgを24時間毎	1000mgを24時間毎	250mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数 100/mm ³ 以上)には、500mgを24時間毎
< 10	500mgを24時間毎	500mgを24時間毎	250mgを24時間毎 なお、HIV感染症の患者(CD4リンパ球数 100/mm ³ 以上)には、500mgを24時間毎
HD(血液透析) PD(腹膜透析)	単純疱疹 1日250mgを週3回HD後	带状疱疹 体重60Kg以上で非高齢者で は 1回500mgを週3回HD後	

ファムシクロビル

クレアチニンクリアランス(ml/min)	単純疱疹	再発性単純疱疹	帯状疱疹
通常	1回250mg 1日3回	1回1000mg 1日2回	1回500mg 1日3回
≥60	1回250mg 1日3回	1回1000mg 1日2回	1回500mg 1日3回
40-59	1回250mg 1日3回	1回500mg 1日2回	1回500mg 1日2回
20-39	1回250mg 1日2回	500mg 単回	1回500mg 1日1回
<20	1回250mg 1日1回	250mg 単回	1回250mg 1日1回
HD(血液透析)	週3回HD後に250mg		
CAPD(持続携行式腹膜透析)	2日に1回CAPD後250mg		

ヘルペス治療薬推奨後発品

- バラシクロビル：

「SPKK（サンド）」 「トーワ」 「サワイ」

- ファムシクロビル：

「日医工」 「トーワ」 「サワイ」