

| 一般名            |          | プロピオン酸系                         | フェニル酢酸系                                                                          | コキシブ系                                                                                                                                          | アニリン系                                                                                        |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | ロキソプロフェンナトリウム水和物                | ジクロフェナクナトリウム                                                                     | セレコキシブ                                                                                                                                         | アセトアミノフェン                                                                                    |
| 先発             |          | ロキソニン                           | ボルタレン、ナボールSR                                                                     | セレコックス                                                                                                                                         |                                                                                              |
| 後発             |          | ロキソプロフェンNa                      | ジクロフェナクNa                                                                        | セレコキシブ                                                                                                                                         | カロナール・アセトアミノフェン                                                                              |
| 規格             |          | 細粒、錠剤                           | 錠剤、カプセル                                                                          | 錠剤                                                                                                                                             | 末、細粒、錠剤、シロップ                                                                                 |
| 1錠薬価           | 先発       | 10.8(60mg)                      | 6.5(25mg)                                                                        | 15.7(100mg)                                                                                                                                    |                                                                                              |
|                | 後発       | 10.5(60mg)                      | 6.1(25mg)                                                                        | 6.3～8.3(100mg)                                                                                                                                 | 6.3～6.5(200mg)                                                                               |
| 用法             |          | 1日3回                            | 1日3回                                                                             | 1日2回                                                                                                                                           | 投与間隔4～6時間                                                                                    |
| 用量             |          | 1回60mg                          | 1日75～100mg                                                                       | 1回100～200mg                                                                                                                                    | 1回300～1000mg                                                                                 |
| 効能効果           |          | 消炎・解熱・鎮痛                        | 消炎・解熱・鎮痛                                                                         | 消炎・鎮痛                                                                                                                                          | 解熱・鎮痛                                                                                        |
| Tmax(hr)       |          | 0.5                             | 2.7(坐剤0.81)                                                                      | 2                                                                                                                                              | 1                                                                                            |
| t1/2(hr)       |          | 1.3                             | 1.3                                                                              | 5～9                                                                                                                                            | 3                                                                                            |
| 消化性潰瘍          |          | 禁忌                              | 禁忌                                                                               | 禁忌                                                                                                                                             |                                                                                              |
| 重篤な血液の異常       |          | 禁忌                              | 禁忌                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                              |
| 重篤な肝・腎障害       |          | 禁忌                              | 禁忌                                                                               | 禁忌                                                                                                                                             | 肝障害のみ禁忌                                                                                      |
| 重篤な心機能不全       |          | 禁忌                              | 禁忌                                                                               | 禁忌                                                                                                                                             |                                                                                              |
| 重篤な高血圧症        |          |                                 | 禁忌                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                              |
| アスピリン喘息またはその既往 |          | 禁忌                              | 禁忌                                                                               | 禁忌                                                                                                                                             |                                                                                              |
| 妊婦             | 添付文書     | 禁忌(妊娠末期)                        | 禁忌                                                                               | 禁忌(妊娠末期)                                                                                                                                       | 有益性>危険性                                                                                      |
|                | FDA      |                                 | C/D                                                                              | C/D                                                                                                                                            |                                                                                              |
|                | AUS(TGA) |                                 | C                                                                                |                                                                                                                                                | A                                                                                            |
| 授乳婦            |          | ◎                               | ◎                                                                                | ◎                                                                                                                                              | ◎                                                                                            |
| 特徴             |          | プロドラッグであり、胃腸障害が比較的少ない。速効性に優れた薬剤 | 強力な解熱・鎮痛・消炎作用を持つ反面、胃腸障害の副作用の頻度が高い。<br>インフルエンザの臨床経過中の脳炎・脳症の患者<br>トリアムテレン投与中の患者に禁忌 | COX－2を選択的に阻害し、胃腸障害が少ないが、心血管系リスクに注意が必要。アスピリン喘息の人にも安全に使用できる。ただし添付文書では禁忌<br>抜歯後の消炎鎮痛目的で使用する場合<br>初回投与量と2回目以降投与量が異なる<br>スルホンアミドに対して過敏症の既往歴のある患者に禁忌 | COX阻害作用はほとんどなく、中枢に作用することで効果を発揮する。<br>インフルエンザ罹患患者、小児、妊婦で多く使用される。<br>1日総量1500mgを越す高用量で肝機能障害に注意 |

# 非オピオイド系鎮痛剤(内用剤)

2026年4月初版

## 鎮痛剤薬価 2026年4月

メフェナム酸

先発 18.9円750mg/日

イブプロフェン

先発 18.9円600mg/日 後発 26.7円600mg/日

ナプロキセン

先発 37.8円600mg/日

ロキソプロフェンナトリウム水和物

先発 32.4円180mg/日 後発 31.5円180mg/日

ザルトプロフェン

先発 32.4-42.0円240mg/日 後発 32.4円240mg/日

ジクロフェナクナトリウム

先発 19.5円75mg/日 後発 18.3円75mg/日

エトドラク

先発 21.0円400mg/日 後発 23.0円400mg/日

ロルノキシカム

先発 32.4円12mg/日 後発 32.4円12mg/日

メロキシカム

先発 19.0円10mg/日 後発9.2-14.4円10mg/日

セレコキシブ

先発 31.4円200mg/日 後発12.6-16.6円200mg/日

チアラミド塩酸塩

先発 32.4円300mg/日

アセトアミノフェン

後発 33.6円1500mg/日

COX阻害作用が少ない

アセトアミノフェン チアラミド

COX-2を選択的に阻害

セレコキシブ

即効性がある

アセトアミノフェン、アスピリン、ロキソプロフェン  
ジクロフェナク、チアラミド ロルノキシカム

消化性潰瘍の患者に禁忌

メフェナム酸、イブプロフェン、ナプロキセン、ロキソプロ  
フェン、ザルトプロフェン、ジクロフェナク、エトドラク、  
ロルノキシカム、セレコキシブ、チアラミド

重篤な腎機能障害患者に禁忌

メフェナム酸、イブプロフェン、ナプロキセン、ロキソプロ  
フェン、ザルトプロフェン、ジクロフェナク、エトドラク、  
ロルノキシカム、セレコキシブ、チアラミド

妊婦 第一選択薬

アセトアミノフェン

妊婦(妊娠後期以外は有益性が  
まさったと判断された場合の投与)

ナプロキセン、ロキソプロフェン、エトドラク  
ロルノキシカム、セレコキシブ

授乳婦に安全に使用できると  
考えられる薬

イブプロフェン、ロキソプロフェン、ジクロフェナク、  
セレコキシブ、チアラミド、アセトアミノフェン

| 効能・効果 | 第一推奨薬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第二推奨薬                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鎮痛    | <div data-bbox="359 204 1047 279"><b>アセトアミノフェン(カロナール®)</b></div> <div data-bbox="405 287 894 579">COX-1,COX-2を介さない<br/>副作用が少ない<br/>鎮痛作用は弱い<br/>妊婦・授乳婦に比較的安全<br/>小児適応を有する<br/>解熱作用を有する</div> <div data-bbox="359 608 978 684"><b>セレコキシブ(セレコックス®)</b></div> <div data-bbox="405 705 1439 948">COX-2のみを選択的に阻害<br/>消化管への影響が少ない<br/>海外で心血管イベントのリスクが示唆されている<br/>スルホンアミドに対して過敏症の既往歴のある患者に禁忌<br/>消炎作用を有する</div> <div data-bbox="359 976 1047 1052"><b>ロキソプロフェン(ロキソニン®)</b></div> <div data-bbox="405 1073 1169 1166">他のNSAIDsと比べて胃粘膜障害が少ない<br/>解熱作用・消炎作用を有する</div> | <div data-bbox="1498 204 2186 279"><b>ジクロフェナク(ボルタレン®)</b></div> <div data-bbox="1544 287 2099 429">強力な鎮痛解熱作用を有する<br/>胃腸障害の副作用の頻度高い<br/>解熱作用・消炎作用を有する</div> |

※日本では2025年4月時点で、10種類以上の鎮痛薬が発売されている。

※成人用のフォーミュラリであることに留意してください。

※がん性疼痛および非がん性慢性疼痛(関節リウマチ、変形性関節症など)は除く

薬剤のインタビューフォーム、添付文書

セレコキシブは骨格にスルホンアミド基を有しているため、スルホンアミドに対して過敏症の既往歴のある患者は禁忌

## 主なスルホンアミド(一般名、販売名)

### サルファ剤/ST 合剤

サラゾスルファピリジン（「アザルフィジン EN 錠」）、スルファメトキサゾール・トリメト プリム（「バクタ配合錠」、  
「バクタミニ配合錠」、「バクタ配合顆粒」、「バクトラミン 配合錠」）

### 利尿薬/利尿薬との配合剤

アセタゾラミド（「ダイアモックス錠」）、アゾセミド（「ダイアート錠」）、インダパミド（「ナトリックス錠」）、  
トラセミド（「ルプラック錠」）、トリクロルメチアジド（「フルイトラン錠」）、トリパミド（「ノルモナール錠」）、  
ヒドロクロロチアジド（「ヒドロ クロロチアジド錠」）、フロセミド（「ラシックス錠」）、ベンチルヒドロクロロチアジド（「ベハイド錠」）、  
メチ克蘭（「アレステン錠」）、メフルシド（「バイカロン 錠」）、ベンチルヒドロクロロチア ジド・レセルピン（「ベハイドR A配合錠」）

### 利尿薬と ARB の配合剤

イルベサルタン・トリクロルメチアジド（「イルトラ配合錠」）、カンデサルタン シレキセチ ル・ヒドロクロロチアジド（「エカード配合錠」）、  
テルミサルタ ン・ヒドロクロロチアジド（「ミコンビ配合錠」）、バルサルタン・ヒドロクロロチアジド（「コディオ配合錠」）、  
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド（「プレミネント配合錠」）

### SU 剤/SU 剤との配合剤(糖尿病治療薬)

アセトヘキサミド（「ジメリン錠」）、グリクラジド（「グリミクロン錠」）、グリクロピラ ミド（「デアメリン錠」）、グリベンクラミド  
（「オイグルコン錠」）、グリメピリド（「アマリール錠」）、 ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド（「ソニアス配合錠」）

### 皮膚潰瘍治療薬

スルファジアジン（「テラジアパスタ」）、スルファジアジン銀（「ゲーベンクリーム」）

# 非オピオイド系鎮痛剤（内用剤）

## 推奨後発品

## 2026年2月

アセトアミノフェン：

「カロナールあゆみ」 「アセトアミノフェンマルイシ」

セレコキシブ：

「杏林」 「J G」 「サワイ」 「日医工」

ロキソプロフェンナトリウム水和物：

「OHA」 「トーワ」 「クニヒロ」 「CH」

ジクロフェナクナトリウム：

「トーワ」 「サワイ」 「TCK」